



PERCHÈ SCEGLIERE FOLIACON 22

1
Contiene azoto nitrico
in sinergia con il
calcio e il magnesio

2
Previene il
disseccamento del
rachide della vite

3
Agisce rapidamente
nella prevenzione
delle carenze di calcio
e magnesio

FOLIACON 22

CALCIO E MAGNESIO INSIEME
PER UNA BILANCIATA SPINTA VEGETATIVA

FERTILIZZANTE UE

conforme al Reg. (UE) 2019/1009

FOLIACON 22 è un fertilizzante ad altissima purezza che consente la somministrazione simultanea di calcio e magnesio nel rapporto 2:1, il più naturale per le piante.

FOLIACON 22 può essere utilizzato in qualsiasi fase del ciclo colturale sia per via fogliare che in fertirrigazione ed è particolarmente indicato a sostenere le colture nella fase di ingrossamento frutto e sviluppo in quanto agisce con rapidità.

FOLIACON 22, a differenza di prodotti simili, presenta un'ottima miscibilità con i più comuni agrofarmaci.

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)

Azoto (N) totale	8,8% p/p (13,2% p/v)
Azoto (N) nitrico	8,8% p/p (13,2% p/v)
Ossido di calcio (CaO) idrosolubile	10% p/p (15,0% p/v)
Ossido di magnesio (MgO) idrosolubile	5% p/p (7,5% p/v)
Rame (Cu) chelato con EDTA idrosolubile	0,01% p/p (0,015% p/v)

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

Densità (20°C): 1,50 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 830 μS/cm

DOSI E APPLICAZIONI

COLTURA	DOSI		FASI D'APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FOGLIARE		
FRUTTICOLTURA	2 - 3,5 l/ha	Da post allegagione	
Pomacee	2 - 3,5 l/ha	Da post allegagione per accrescimento frutto e prevenzione butteratura amara	
Drupacee	2 - 3,5 l/ha	2-3 interventi post allegagione	
Actinidia	2 - 3,5 l/ha	Da post allegagione e fino alla 5° settimana dopo allegagione avvenuta	
Agumi	2 - 3,5 l/ha	Da pre invaiatura a fine maturazione	
UVA DA TAVOLA E DA VINO	2 - 4 l/ha	Da accrescimento acini a pre chiusura grappolo. Prevenzione disseccamento del rachide	
OLIVICOLTURA	2 - 4 l/ha	Da frutticino 5 mm	
ORTICOLTURA SOLANACEE (pomodoro, peperone, melanzana, ecc...)	2 - 3 l/ha	Da post-allegagione per tutto il ciclo colturale per accrescimento frutto e prevenzione marciume apicale	
ORTICOLTURA CUCURBITACEE (melone, anguria, zucchini, zucca, cetriolo ecc..)	2 - 3 l/ha	Da post-allegagione per tutto il ciclo colturale per accrescimento frutto e prevenzione disseccamento fisiologico	
ALTRE ORTICOLE (ortaggi da foglia)	2 l/ha	Da post trapianto a fine ciclo per accrescimento cespo e contro il tip-burn	
FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI	2 - 3 l/ha	Da inizio allegagione ogni 12-15 giorni	
PIANTE ORNAMENTALI, FLORICOLTURA, VIVAIO	150 - 200 ml/hl	Ripresa vegetativa e pre fioritura	
In fertirrigazione 10 - 20 l/ha			

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) prima di concludere il contratto d'acquisto si richiede di prendere visione dei pericoli associati al prodotto.