

Triabon®

Concime minerale a lento effetto.

Il Triabon® è un concime minerale a lento effetto contenente il 70% dell'azoto totale sotto forma di Crotodur®, azoto organico di sintesi ad azione prolungata. La contemporanea presenza di forme azotate a pronto effetto e di Crotodur® assicura lo sviluppo iniziale delle colture ed un'elevata persistenza d'azione. La presenza dei principali microelementi in forma chelata ne completano l'efficacia.

Durante il periodo vegetativo il Crotodur® si trasforma nelle forme assimilabili dalle piante mediante degradazione microbiologica ed idrolisi fisico-chimica. Essendo il processo di degradazione microbiologica preponderante, l'effetto dell'acidità del suolo sulla liberazione dell'azoto è praticamente nullo.

L'influenza dell'umidità e della temperatura sulla curva di degradazione del Crotodur® è in completa sintonia con lo sviluppo vegetativo delle piante. Questo è un notevole vantaggio sia dal punto di vista economico, perché consente di limitare gli interventi di copertura, sia dal punto di vista ecologico perché non si libera azoto in quantità superiori alle reali esigenze delle piante e si riduce drasticamente il dilavamento.

Il Crotodur® contenuto nel Triabon® rende il fertilizzante sicuro e pratico garantendo contemporaneamente un equilibrato apporto di azoto anche con temperature di 10°C. Ciò impedisce che si verifichino carenze o alterazioni della crescita delle piante dovute a sbalzi nutritivi. La lenta ed adeguata cessione di sostanze nutritive (3-4 mesi) mantiene costante la concentrazione salina, permettendo una completa esplorazione del substrato da parte delle radici. Per la sua composizione e per il tipo d'azione che svolge,



questo concime è particolarmente indicato per la concimazione dei substrati in floricoltura, nei vivai e in orticoltura.

Composizione

Azoto totale (N)	16%
Anidride fosforica	8%
Ossido di potassio	12%
Ossido di magnesio	4%
Anidride solforica sol.	18%

**Confezioni
disponibili**


Tipo di confezione	Volume	Confezioni/bancale
Sacco	25 Kg.	40

**EXPERTS
FOR GROWTH**



Triabon[®]

**concime con azoto
a lento rilascio Crotodur[®]
specifico per la floricoltura
e il vivaismo**



Vivaismo



Floricoltura



Orticoltura

COMPO Agro Specialities Srl
Divisione COMPO Expert
Via Marconato 8
I-20811 Cesano Maderno MB
Tel. 0362 512.1
Fax 0362 512855
info.compo-expert@compo.com
www.compo-expert.it

Distribuzione e vendita:


AGROCHIMICA

AGROCHIMICA Spa
Via Copernico 11
I-39100 Bolzano
Tel. 0471 563700
Fax 0471 563799
info@agrochimica.it
www.agrochimica.it

Triabon®, concime minerale a lento rilascio, contiene il 70% dell'azoto sotto forma di **Crotodur®** che assicura la nutrizione delle colture per 12-16 settimane; la restante frazione, a pronto effetto, ne garantisce lo sviluppo iniziale.



Triabon® contiene anche fosforo, potassio da solfato, magnesio e tutti i microelementi necessari allo sviluppo delle colture specialistiche.

Crotodur®

Durante il periodo vegetativo, il **Crotodur®** si trasforma nelle forme azotate assimilabili dalle piante prevalentemente mediante idrolisi.

Grazie alla combinazione di questi due processi, **Triabon®** mantiene le sue caratteristiche di lento rilascio in qualsiasi condizione ambientale, senza alcuna influenza da parte del pH o dell'attività biologica del substrato. La liberazione dell'azoto avviene pertanto in armonia con lo sviluppo delle piante, garantendo vantaggi economici ed ecologici grazie alla limitazione delle perdite di azoto.

Il **Crotodur®** è efficace anche a basse temperature, quando i normali concimi a cessione programmata non riescono a cedere gli elementi nutritivi; anche con temperature di 10 °C, **Triabon®** libera l'azoto contenuto in funzione della richiesta da parte della coltura. In questo modo viene mantenuta costante la concentrazione salina del substrato, permettendo una completa esplorazione da parte delle radici e preservando la pianta da pericolosi aumenti di salinità.



COMPOSIZIONE

- 16%** Azoto (N) totale
 - 5% Azoto (N) ammoniacale
 - 11% Azoto (N) della crotonilidendiurea
- 8%** Anidride fosforica (P_2O_5)
 - solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua
 - 6% Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua
- 12%** Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua
- 4%** Ossido di magnesio (MgO) totale
 - 3% Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua

- 22%** Anidride solforica (SO_3) totale
 - 18% Anidride solforica (SO_3) solubile in acqua
- 0,02% Boro (B) solubile in acqua
- 0,04% Rame (Cu) solubile in acqua
- 0,1% Ferro (Fe) solubile in acqua
- 0,1% Manganese (Mn) solubile in acqua
- 0,015% Molibdeno (Mo) solubile in acqua
- 0,007% Zinco (Zn) solubile in acqua

A basso tenore di cloro

Formulazione: granulare
Confezioni: sacchi da Kg 25

Dosi e modalità di impiego

Triabon® trova la migliore collocazione nella riconcimazione di copertura dei vasi. Grazie alla particolare formulazione si scioglie rapidamente evitando perdite di prodotto conseguenti ad un eventuale rovesciamento del vaso.

Triabon® può essere impiegato anche mescolato al substrato come concimazione di base.

Fabbisogno Nutrizionale	1° anno: Kg/m ³ di substrato	dal 2° anno: Kg/m ³ di substrato
BASSO	0,5-1,5	1-2
MEDIO	1-2	2-3
ALTO	1,5-2	3-4